



## H12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille

**On väistämätöntä, että joku porsas ei kasva yhtä hyvin, kuin muut pahnueessa. Nämä kannattaa siirtää sijaisemolle.**

1. Sijaisemo kasvattaa porsaita, jotka eivät pärjää oman pahnueen joukossa.
2. Sijaisemo on hyvin toimiva emakko, joka on vieroittanut tasaisen kokoisia vahvoja porsaita, jotka ovat siirretty vieroitusosastolle.
3. Sijaisemo voi olla emakko joka on menossa teuraaksi.
4. Vähennä sijaisemon ruokintaa 2 ry/emakko.
5. Siirrä porsaat sijaisemolle ennen kuin kasvu pysähtyy.
6. Varmista että emakko hyväksyy porsaat.
7. Älä käytä sijaisemoa pienille mutta muuten kasvaville, terveille porsaille.



Nälkäinen porsas joka pitäisi siirtää

### Älä siirrä:

- sairasta porsasta. Se tartuttaa muut porsaat. Hoida sairasta porsasta ja tarjoa sille ternimaitoa.
- terveitä, pieniä porsaita, jotka silti kasvavat. Tämä sekoittaa imettämisyjärjestystä pahnueessa.
- porsasta vielä toiselle sijaisemolle, jos tämä ei ole valmis vieroitukseen, kun muut pahnueen porsaat vieroitetaan.



Sairas porsas jota ei kannata siirtää



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



## Lisäkommentteja – Sijaisemo heikentyneille porsaille

1. Muodosta yleinen toimintatapa, milloin tehdä sijaisemo. Aseta pyykkipoikia emakkokortteihin karsinoissa, jossa porsaas näyttävät merkkejä heikentymisestä. Tee sijaisemo, kuin pyykkipoikien määrä vastaa sopivaa määrää porsaita yhdelle emakolle. Pidä heikentyneitä porsaita tarkasti silmällä niin, että sijaisemo tehdään ajoissa. Katso liite 14 – Sijaisemo.
2. Sijaisemon on oltava terve, hyvässä fyysisessä kunnossa ilman lapavaurioita tai jalkavaurioita.
3. Sijaisemona voi myös käyttää hyvässä fyysisessä kunnossa olevaa emakkoa, joka on menossa teuraaksi. Sijaisemo saattaa tulla kiimaan porsimisosastolla mutta tämä ei vaikuta tuotantoon, koska se on menossa teuraaksi. Tuotannolle on parasta, jos käyttää nuoria emakoita ammana, siksi nuoria emakoita usein ei riitä sijaisemoksi.
4. Vähennä emakon ruokintaa 2 ry, jotta se ei tule kiimaan tai lakkaa syömästä. Pidä emakkoa silmällä ja tarkista syöntiä ja utaretulehduksen merkkejä utareessa ensimmäiset kaksi päivää porsaiden siirtämisen jälkeen.
5. Porsaiden heikentyminen johtuu useimmiten siitä, että ne näkevät nälkää. Siksi sijaisemo pitää tehdä nopeasti, varsinkin ensimmäisen viikon aikana syntymän jälkeen. Ensimmäisen viikon jälkeen yleisimmät syyt porsaiden siirtämiseen on emakon sairaudet tai toimimattomat nisät.
6. Jos porsaas ovat levottomat, emakko makaa mahallaan tai seisoo paljon vuorokauden kuluttua, voi tämä johtua siitä, ettei emakko ole hyväksynyt pahnuetta. Voi myös olla, että emakon maidontuotanto on loppunut, harkitse pahnueen vaihtoa. Katso H11- Pahnueen vaihto.
7. Porsaas saattavat olla eri kokoisia pahnueessa. Älä siirrä niitä jos ne kasvavat ja ovat vahvoja omassa pahnueessaan.

