



H16 – Porsaiden sairaudet ja hoito

Terve porsas:

1. On pyöreä ja sillä on kiiltävä, sileä karva
2. Ulostaa normaalisti, ja uloste on normaalin näköistä
3. Pitää pään ja korvat normaalissa asennossa
4. Hengittää ilman vaikeuksia
5. Ei onnu
6. Makaa normaaliin tapaan porsaspesässä.
7. Tulee imemään, kun emakko kutsuu



Porsaan lääkitseminen

On tärkeätä tarkistaa porsaet päivittäin, erityisesti ensimmäisen viikon aikana porsimisen jälkeen, koska ajoissa ongelmiin puuttuminen pelastaa henkiä.

Porsas saattaa olla sairas jos:

- Se ei tule utareelle
- Eristäytyy muista pahnueen porsaista
- Se on likainen
- Kulkee pää kallellaan
- Korvat osoittavat taaksepäin
- Porsas ontuu
- Karsinassa tai porsaissa näkyy merkkejä ripulista



Porsaita ei ole hoidettu oikein



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Lisäkommentteja – Porsaiden sairaudet ja hoito

Jokapäiväisen tarkkailun aikana on tärkeää arvioida, tuleeko sairas porsas lääkitä vai lopettaa. Jos porsas on suositellun hoidon jälkeen edelleen sairas, arvio uudelleen voiko porsas tervehtyä hoitoa jatkamalla vai tuleeko se lopettaa. Halvaantuneet tai jalkansa murtaneet porsaas tulee lopettaa välittömästi. Sairas porsas tarvitsee lämpimän ympäristön, jossa on helposti vettä tarjolla. Katso liite 16 – Hoitoapu (esimerkki).

1. Porsas, joka on pitkäkarvainen, tai huonoihoinen on sairas ja heikentynyt, mahdollisesti nälästä. Hoida porsas, mikäli se on sairas. Kalpea porsas voi kärsiä raudan puutteesta tai olla muuten sairas. Tarkista raudan antotapa ja aika – saavatko kaikki porsaas tarvittavan raudan? Katso H17 – Rauta, kastraatio ja hampaat.
2. Jos huomaat ripulia karsinassa, tarkista onko ripulia vain yhdellä porsaalla, vai koko pahnueella. Jos kaikki porsaas ovat sairaita voi olla, ettei emakolta tule riittävästi maitoa, tai porsaiden ympäristö liian kylmä. Älä siirrä ripuliporsaita ja älä itse mene ripulikarsinasta suoraan toiseen karsinaan, koska ripuli tarttuu helposti. Porsaas, joilla on ripulia tarvitsevat paljon nestettä, nopeasti; tarjoa lisävettä tai mahdollisesti elektrolyyttiliuosta. Katso H23 – Porsaiden ruokkiminen. Hoida porsaas hoitavan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
3. Jos porsaan pää on kallellaan, sillä luultavasti on aivokalvontulehdus tai välikorvantulehdus. Molemmat sairaudet voidaan hoitaa antibioottikuurilla ja antaa myös särkylääkettä tarpeen mukaan. Turvonnut korva voi johtua korvahematomasta (verikorva). Tämä johtuu korvan verisuonen repeämästä eikä sitä voi hoitaa.
4. Normaali hengitys on rauhallista, ilman vaikeuksia ja ilman sivuääniä.
5. Jos porsas ontuu sillä voi olla niveltulehdus, sorkkapaise, tai se voi olla maattu, tai tallottu. Niveltulehdukset ja sorkkapaiset hoidetaan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
6. Jos porsas ei makaa normaalisti porsaspesässä voi se olla sairas. Porsaspesä voi myös olla liian kuuma tai kylmä. Katso H13 – Porsaiden ympäristö.
7. Jos porsas ei tule utareelle imemään, kun emakko imettää, se voi olla sairas tai utareella ei ole tarpeeksi tilaa kaikille porsaille, tai sillä ei vain ole nälkä. Katso H2 - Porsimiskarsinan toiminnalliset vaatimukset.

Pidä yllä järjestelmää, joka helpottaa sairaan porsaan tunnistamista hoidon aikana, esimerkiksi merkkäamalla sitä värisprayllä, hoitokerroittain. Eri värejä tai merkkäuspaikkaa voidaan käyttää määrittämään, mikä lääke, lääkintäkerta tai sairaus on kyseessä. Laita pyykkipoika kiinni emakkokortin sovittuun kohtaan, jotta sairaat eläimet on helppo löytää. Ota pyykkipojat pois, kun lääkitys on valmis.

