



H23 - Porsaiden ruokinta

Porsaiden energian, kivennäisen ja vitamiinien tarve on ensisijaisesti tyydytettävä emakon maidon kautta.

1. Ala totutella porsaita vieroitusrehuun 10 päivän ikäisestä lähtien.
2. Ruoki porsaat 2-5 kertaa päivässä.
3. Tyhjää ja puhdista ruokintakaukalo vähintään kerran päivässä.
4. Jos porsaat ovat sairaita ne voivat tarvita vettä, energiaa ja kivennäisiä, ja niiden suoliston tasapaino voi olla kärsinyt. Silloin voi olla tarvetta elektrolyyttiliuoksen tai maitopohjaisten tuotteiden käyttöön.



Porsaiden ruokinta

Ruoka	Positiivista	Negatiivista	Sopii
Porsasrehu (startteri)	Totuttaa porsaat vieroituksen jälkeiseen ruokintaan ja lisää syöntikykyä. Hyvä energian lähde. Voi ehkäistä nisien purentaa. Helppo jakaa.	Huono rehun hyväksikäyttö ennen kuin porsaat ovat 3-4 viikon ikäisiä.	n. 10 päivän ikäisille porsaille rehuun totutteluun
Elektrolyytti	Antaa nestettä, kivennäisiä, energiaa	Kallis, jos ostat valmiiksi sekoitettua tuotetta	Porsaille joilla on ripulia
Maitopohjaiset lisärehut	Sisältävät maitohappobakteereita (probiootteja) ja energiaa	Iso riski huonolla hygienialla. Rajoitettu säilyvyys	Alipainoisille porsaille, porsaille joiden emä on sairas

Väärä ruokinta

Porsasrehu (kuiva tai velli):

- Kaukalo on likainen/ sisältää märkää ruokaa
- Liian vähän ruokintakertoja / päivä
- Rehun haaskaaminen
- Rehu on vanhaa

Maitopohjaiset lisärehut:

- Kaukalo on likainen
- Maito ei ole sekoitettu ohjeiden mukaisesti
- Seos seisoo ruokintakaukalossa enemmän kuin 6 tuntia
- Vesinippoja ei ole / vesinipalle pääsy on estynyt.



Huono ruokintahygienia



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Lisäkommentteja – Porsaiden ruokinta

Porsaiden ruokintakaukalo ei saa estää porsaita pääsemään vesinipalle.

1. Ala totutella porsaita porsasrehuun n. 10 päivän iässä tarjoamalla rehua joko kuppiin tai lattialle. Jos porsituskarsina on täysritilä –mallinen, jaa rehua joko lämpölevylle makuualueelle, tai ruokintakuppiin. Ensimmäisten päivien aikana voi ruokaa laittaa emakon lähelle →emakon kiinnostus rehua kohtaan herättää myös porsaiden kiinnostuksen.
2. Porsaiden syöntikyky vaihtelee paljon pahnueiden välillä; pahnue, jossa on 24 päivän ikäisiä porsaita saattavat syödä 100g -1 kg rehua päivässä.

2 - 5 ruokintakerran avulla voidaan lisätä rehua porsaiden tarpeen mukaan:

- 2 ruokintakertaa / päivä: toisella imetysviikolla
- 3 ruokintakertaa / päivä: kolmannella imetysviikolla
- 4 ruokintakertaa / päivä: neljännellä imetysviikolla
- 5 ruokintakertaa / päivä: viidennellä imetysviikolla

Optimaalisen rehunsyöntikyvyn saavuttamiseksi ruoki porsaat ruokahalun mukaan kolmannelta viikosta alkaen.

3. Ruokintakaukalon on oltava puhdas ja tyhjä ennen ruokintaa.

Ruokintakaukalon täytyy tyhjentää vähintään kerran päivässä, koska:

- hyvän hygienian ylläpitämiseksi
- rehu menettää makunsa ja aromiaineet, jos se on liian kauan ruokintakaukalossa
- porsaiden uteliaisuus herää, kun tuot uutta ruokaa tyhjiin ruokintakaukaloon

4. Sairauksien tai muiden ongelmia yhteydessä voi olla tarpeen tarjota porsaille elektrolyyttiä tai maidonkorvikkeita emakon maidon lisäksi. Älä anna porsaille jotka ovat alle 12 tunnin ikäisiä mitään korvikkeita, jotta ne saisivat tarpeeksi ternimaitoa.

Elektrolyyttiä annetaan porsaille, joilla on ripulia nestetasapainon säilyttämiseksi.

- Tee liuos päivittäin. Anna enintään 1 litra/pahnue kaksi kertaa päivässä ensimmäisen viikon aikana.
- Hygienia tärkeää! Kaukalo tulee olla tyhjennetty ja pesty ennen elektrolyyttiliuoksen antamista.

Maitopohjaisia valmisteita voi käyttää rehulisinä, mutta ei voi korvata emakon maitoa:

- Esim. YoghurLac on pienille porsaille tarkoitettu lisärehu, jolla pelastetaan pahnueen pienimmät ja heikoimmat porsaat. YoghurLac tukee porsaan ruuansulatusta; se sisältää runsaasti maitohappobakteereja ja elektrolyyttejä.
- A-Rehu YoghurLacissa on kolme hyvää yhdessä: maidonkorvike + elektrolyytit + maitohappobakteerit.
- Voi käyttää ripulin ennaltaehkäisyyn eri pahnueissa koska se tarjoaa maitohappobakteereita.
- Sopii porsaille jotka ovat heikkoja porsimisen jälkeen.
- Hygienia! Tyhjennä ja pese ruokintakaukalo päivittäin.

Lehmän ternimaito:

- Ei korvaa emakon ternimaitoa, koska ei sisällä oikein tyyppisiä vasta-aineita
- Voidaan käyttää energialisänä sen jälkeen, kun porsas on saanut riittävästi emakon ternimaitoa
- Voidaan varastoida pakkasessa ja annostella siemenpusseihin ja juottaa suoraan porsaan suuhun. Muista lämmittää ruumiinlämpöiseksi.

Maidonkorvike:

Vaikka porsaat ovat saaneet emakolta ternimaitoa ja saivat maidonkorviketta, on niiden saatava myös emakon maitoa.

- Hygienia on tärkeää maidonkorvikkeita käytettäessä. Tyhjennä ja pese ruokintakaukalo ennen jokaista ruokintaa, ja pese myös kaikki välineet joita on käytetty maidon sekoittamiseen.
- Sekoita maitojauhe ja vesi ohjeiden mukaisesti. Veden tulee olla oikean lämpöistä. Jos se on liian kylmää, maitojauhe ei liukene, jos se on liian kuumaa proteiinit tuhoutuvat.
- Sekoita maitoa, kunnes kaikki paakkuuntumat ovat liunnet. Paakkuuntumat voivat aiheuttaa ongelmia porsaan suolistossa.
- Maidonkorvike pitää käyttää muutamassa tunnissa, muuten se pilaantuu kaukalossa.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin