



H8 – Pahnuetasaus

Pahnuetasauksella pyritään saamaan emakko hoitamaan mahdollisimman monta porsasta

1. Varmista että porsaasat ovat saaneet ternimaitoa 12 tunnin ajan ennen siirtämistä.
2. Tasaa emakolle 12-15 porsasta, riippuen kuinka monta toimivaa nisää emakolla on. Hyödynnä emakot joilla pieni pahnue ja ylimääräisiä toimivia nisiä.
3. Tee amma-emakko ylimääräisille porsaille.
4. Aseta pienimmät porsaasat emakolle joka on porsinut toisen kerran.
5. Pahnueiden tasaus tulee olla valmis 36 tunnin kuluttua porsimisesta.
6. Siirrä pääasiallisesti isoja/vahvoja porsaita
7. Siirrä porsaita pahnueiden välillä niin vähän, kun mahdollista, mutta pyri siirtämään ne aina jo ennen kasvun hidastumista.
8. Älä tee pahnuetasauksia enää yli kahden päivän ikäisissä pahnueissa. Siirrä tarvittaessa porsaasat, jotka ovat yli 2 päivän tai vanhempia sijaisemolle.



Kaikkien porsaiden on saatava toimiva nisä

Epäonnistunut pahnuetasaus:

- Emakko voi hoitaa korkeintaan yhtä monta porsasta, kuin sillä on toimivia nisiä
- Pienimmät/viimeisenä syntyneet porsaasat häviävät taistelun maidosta.

Pahnuetasaus liian aikaisin:

- Porsaasat eivät saa tarpeeksi ternimaitoa jo voivat kuolla vasta-aineiden puutteeseen.

Pahnueen tasoittaminen liian myöhään:

- Häiritsee jo muodostunutta syömisjärjestystä
- Mikäli porsimisesta kulunut liian kauan, ei käyttämättömiksi jääneistä nisistä tule enää maitoa



Emakolla on liian monta porsasta



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Lisäkommentteja – Pahnueen tasoittaminen

1. On tärkeää varmistaa, että kaikki porsaasat ovat saaneet ternimaitoa ennen pahnuetasausta. Pienimmät porsaasat tarvitsevat jopa 12 tuntia aikaa saadakseen tarpeellisen määrän ternimaitoa. Jos pieni porsas siirretään porsivalle, tai juuri porsineelle emakolla se saa ternimaitoa siltä.
Jos pahnueessa on liian monta porsasta, tee pahnuetasaus/siirrä isoimmat porsaasat amma-emakolle 12 tunnin jälkeen varmistaaksesi pienempien porsaiden ternimaidonsaannin. Isoissa pahnueissa on myös mahdollista siirtää amma-emakolle ensimmäisenä syntyneet porsaasat, kun ne ovat olleet 12 tuntia syntymästään omalla emällä, tässä tapauksessa, sinun tulee kuitenkin tietää, mitkä porsaasat ovat syntyneet ensin!
Jos porsiminen ei ole vielä valmis, tai et voi aloittaa pahnuetasausta, eristä isoimmat/vahvimmat porsaasat makuualueelle ja jätä pienimmät/heikommat utareelle imemään.
2. Kuinka toimia imetyskykyyn nähden ylimääräisten porsaiden kanssa:
 - siirrä ylimääräiset porsaasat juuri porsineelle emakolle, jolla vapaita nisiä.
 - jos emakko on porsinut viimeisen kahden päivän aikana ja yksi porsas kuolee, voit laittaa tilalle yhden porsaan. Siirrettävän porsaan täytyy olla isompi, kuin loput porsaasat pahnueessa.
 - jos siirät porsaita emakolle, jolta on kuollut porsaita yksi tai enemmän, varmista että emakko ei ole sairas ja ettei sillä ole enemmän porsaita kuin toimivia nisiä.
 - arvioi emakon fyysinen kunto ja katso emakkokortista kuinka viime imetyskausi meni.
 - vanhoille emakoille (viides porsiminen tai enemmän) ei kannata laittaa enemmän porsaita, kuin viimekerroilla on ollut.
3. Toinen on tehdä ylimääräisille porsaille amma-emakko (katso H9 – Amma-emakko)
4. Emakot jotka porsivat toisen tai kolmannen kerran ovat parempia hyväksymään uusia pieniä porsaita. Vältä käyttämästä ensikkoa ammana, koska se tarvitsee mahdollisimman isoja porsaita stimuloimaan utaretta.
5. Varmista, että kaikki porsaasat saavat toimivan nisän, pahnuetasaus tulee olla valmis 36 tuntia porsimisesta. Jos pahnuetasaus kestää kauemmin on riski, ettei vapaista nisistä tule enää maitoa.
6. Saattaa kestää useita tunteja (3-6) ennen kuin porsaasat saavat uudelta emakolta maitoa. Siksi siirrettävien porsaiden tulee olla tarpeeksi voimakkaita. On myös tärkeää, että siirretty porsaasat ovat n. samaa kokoa kuin muut porsaasat pahnueessa.
7. **Sääntö:** porsaasat pärjäävät parhaiten oman emonsa luona, siksi kannattaa siirtää mahdollisimman vähän porsaita. Huomioi heikot porsaasat:
 - pienet porsaasat
 - levottomat porsaasat
 - porsaasat jotka makaavat passiivisena makuualueella tai sen ulkopuolella.
8. Katso H 12 – Sijaisemo heikentyneille porsaille

