



## Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju -hanke



### H1 Vieroitettujen päivittäinen tarkkailu

#### Vieroitettujen tarkkailu:

1. Tarkista vieroitetut vähintään kahdesti päivässä, myös viikonloppuisin
2. Tarkista huoneiden olosuhteet
3. Tarkista ruuhet / ruokkijat
4. Tarkista porsaasat hetkellä, kun ne ovat aktiivisia
5. Kaikki porsaasat tulee saada ylös – antamalla olkea yms. tai käyttämällä ”melaa”
6. Tarkista ne porsaasat, mitkä näyttävät sairailta, tai toimivat epänormaalisti.
7. Merkitse sprayllä epänormaalit porsaasat
8. Päätä, lääkitäänkö porsas ja /tai siirretäänkö sairaskarsinaan



#### Havainnoi seuraavia mahdollisia ongelman merkkejä:

- Porsaasat, jotka eivät nouse nopeasti ylös
- Ontuvat porsaasat
- Porsaasat, joilla on raskas hengitys → seuraa kylkiä
- Porsaasat, joilla syöty häntä, tai syö toisten häntää
- Porsaasat, jotka eivät voi hyvin (katso kuva)
- Porsaasat, jotka eivät syö
- Levoton porsas kävelee ympäriinsä, kun muut lepäävät





## Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju -hanke



1. Porsaat tulee tarkastaa vähintään kahdesti päivässä. Jos porsaat ruokitaan käsin, tarkasta porsaat ruokinnan yhteydessä.  
Vähintään kerran päivässä tulee kaikki porsaat saada ylös, jotta voisi nähdä, tarvitseeko joku porsas erityishoitoa. Tarkasta myös veden saanti.
2. Jos on mahdollista, tarkista rauhallisella hetkellä porsaiden makuukäyttäytyminen ja toiminta huoneen ikkunan takaa. Mene huoneeseen varovasti / hiljaa, tarkista, miten porsaat makaavat karsinassa. (Makuukäyttäytymisestä ja olosuhteissa lisää toisessa kortissa)
3. Tarkasta kuivaruokinnassa, että automaatista tulee sopivasti rehua, eikä automaatti holvaa / rehua tule ylen määrin. Sopivamäärä on sellainen, että lautasella näkyy jonkin verran rehua. Erityisesti vieroitusvaiheessa automaatti tulee olla ”herkällä”, jotta porsaat saavat rehua. Lisäksi lautaselle tulee varistaa/laittaa rehua jo valmiiksi odottamaan. Porsaiden kasvaessa säätöä muutetaan lautasella olevan rehumäärän mukaan. Automaatissa ei saa olla varastossa rehua enempää, kuin porsaat syövät noin päivässä, jotta rehu säilyy hyvän makuisena. Tämän vuoksi osassa tulee säätää automaatissa olevaa rehumäärää porsaiden kasvaessa. Kuivassa vapaaruokinnassa rehu ei saa loppua automaatista päivän aikana, se aiheuttaa käyttäytymishäiriöitä.

Seuraa liemiruokinnassa ruokinnan mukana, että kaikki porsaat saavat rehua. Tarkasta oikea ruokintamäärä ruokinnan jälkeen, korjaa määrää tarvittaessa + / - prosenteilla. Tarkkailuhetki tulee olla sopivan ajan kuluttua ruokinnasta, puolesta tunnista – tuntiin, riippuen ruokintakerroista. Tarkkailuhetkellä tulisi olla hieman rehua jäljellä ”ruuhessa näkyy sorkanjäljet”. Jos ruuheen jää vanhaa rehua, se tulee puhdistaa kerran päivässä. Lisäksi ruuhien päihin saattaa jäädä vanhaa rehua, poista se myös päivittäin, sillä se aiheuttaa makuongelmia uuteen liemeen. Kiinnitä erityisesti ruokintahetkellä huomiota myös liemen koostumukseen: onko liemi sopivan jäykkää, onko liemessä liian suuria partikkeleita (jauhatus, sulamaton rehu). Ruuhessa liemi ei saa lajittua niin, että vesi nousee pintaan ja kuiva painuu alas.

4. Tarkista, että kaikki porsaat nousevat ylös helposti. Tarkista porsaat menemällä jokaiseen karsinaan vieroituksesta 2 viikon ajan. Vanhemmilla voit hyödyntää mm. ruokinta-aikoja, jolloin porsaat ylhäällä. Näin on mahdollista tarkistaa porsaiden terveydentila ja löytää riittävän ajoissa poikkeavasti käyttäytyvät ja / tai porsaat, jotka ovat sairaita. Aloita tarkkailu nuorimmista, ja lopeta vanhimpiin, jottet vie muknasi nuoremmille ongelmia muilta porsailta. Huomioi kuitenkin sairaitten eläinten karsinat kiertojärjestyksessä.
5. Porsaiden ylös saannissa kannatta hyödyntää olkea yms. kuiviketta tai ruokinta-aikoja. Myös ”mela” on hyvä apuväline porsaiden ylös ajamiseen karsinassa.
8. Siirrä sairas porsas välittömästi sairaskarsinaan. Lääkitse / hoida porsas eläinlääkärisi ohjeiden mukaan.